

SBIRT research in Latin America: A brief summary of ongoing projects and an invitation to action



Marcela Tiburcio Sainz



INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ

Funding: Pan American Health Organization



Background

- Different levels of research and implementation
- E. g. Chile has adopted SBIRT as public policy
- Assessment of mental health care in CA according to WHO-AIMS methodology served as the basis to establish national plans (Aparicio, Rodriguez, 2012) objectives:
 - To implement SBIRT in primary health care services
 - To training health professionals in the implementation of mhGap, ASSIST and AUDIT
- In general the infrastructure is limited though it has grown during the last decade, only 30% of primary health care facilities has protocols to detect and treat mental health conditions (including substance abuse) (Berenzon, Saavedra, Medina-Mora, Aparicio, Galván, 2013).
- CENADIC: 335 addiction prevention centers nationwide. Free prevention, identification and brief intervention for alcohol and drug users. Assessment
- Lack of human and financial resources, and thus, lack of research and assessment (Babor, Rossi, Stenius, Maiga, Monteiro, Fitzgerald, 2017).

País	Referencias
Colombia	<p>¹Ministerio de Salud y Protección. Guía de práctica clínica para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la fase aguda de intoxicación de pacientes con abuso o dependencia del alcohol. Abril 2013. Páginas 1–48. Bogotá, Colombia.</p> <p>²De la Espriella Guerrero, R., de la Hoz Bradford, A. M., Gómez-Restrepo, C., Zárate, A. U. H., Menéndez, M. C., Barré, M. C., ... & Hernández, D. C. (2012). Guía de práctica clínica para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la fase aguda de intoxicación de pacientes con abuso o dependencia del alcohol: Parte I: Tamización, detección temprana y factores de riesgo en pacientes con abuso o dependencia del alcohol. <i>Revista Colombiana de Psiquiatría</i>, 41(4), 787-804.</p> <p>³Ministerio de la Protección Social. Manual para la detección e intervención temprana del consumo de sustancias psicoactivas y problemas de salud mental en los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Abril de 2011. Páginas 1-95. Bogotá, Colombia.</p>
Chile	<p>¹Orientaciones administrativas para la implementación del programa “Vida sana”: componente alcohol. Fase de Implementación 2014. Gobierno de Chile.</p> <p>²Lineamientos para la asignación de recursos en programas de tratamiento e integración social servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol primer trimestre (1° de enero–30 de marzo 2015).</p> <p>³http://www.senda.gob.cl/</p> <p>⁴Estrategia Nacional de Salud (MINSAL, 2011).</p> <p>⁵Intervenciones breves para reducir el consumo de alcohol de riesgo, Guía técnica para atención primaria en salud. Octubre de 2011. Páginas 1-43. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.</p>
Panamá	<p>¹Boletín de salud mental (OPS/OMS), julio-agosto 2010.</p> <p>²http://www.campusvirtualsp.org/</p> <p>³Avances, seguimiento a los acuerdos de la XXIX RESSCAD. Panamá, 9 de abril, 2014.</p> <p>⁴Aparicio, V., & Rodríguez, J. (2012). Logros y pendientes de la reforma psiquiátrica en Panamá y Centroamérica de habla hispana. <i>Medwave</i>, 12(10).</p>
Brasil	<p>¹Ronzani, T. M., Mota, D. C. B., & de Souza, I. C. W. (2009). Prevenção do uso de álcool na atenção primária em municípios do estado de Minas Gerais. <i>Revista de saúde pública</i>, 43(suppl. 1), 51-61.</p> <p>²Ronzani, T. M., Ribeiro, M. S., Amaral, M. B. D., & Formigoni, M. L. O. S. (2005). Implantação de rotinas de rastreamento do uso de risco de álcool e de uma intervenção breve na atenção primária à saúde: dificuldades a serem superadas. <i>Cad Saúde Pública</i>, 21(3), 852-861.</p> <p>³Organización Panamericana de la Salud. (2011). Marco de Referencia para la implementación de la Estrategia Regional de Salud Mental.</p> <p>⁴Legislação e Políticas Públicas sobre Drogas/Brasília, Presidência da República, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2010.</p>
Argentina	<p>¹Pautas y herramientas para la atención integral (PHAI) frente al consumo excesivo de sustancias, en particular el alcohol (2010) Ministerio de salud, Argentina.</p> <p>²Lineamientos normativos para la atención integral de la población frente al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, Programa nacional de prevención y lucha contra el consumo excesivo de alcohol (2011) Ministerio de salud, Argentina.</p> <p>³Lichtenberger, A., López, M., & Cremonte, M. (2015). Intervención breve para promover la abstinencia de consumo de alcohol en mujeres gestantes. Una reflexión crítica. <i>PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica</i>, 7(3).</p>

INFORMATIVE BULLETIN

2 numbers in 2007
Spanish & Portuguese



2 numbers in 2012
Portuguese



8 numbers 2016-18
Spanish



Collaborations from: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, PAHO, Panamá, Puerto Rico and Spain.

<http://inebria.net/latina/recursos-y-formacion/>

WEBINARS

INEBRIA Latina

Detección temprana e intervención breve del consumo de sustancias en Centros de Atención Primaria a la Salud a través del ASSIST: Un estudio binacional México-Estados Unidos

Impartido por: Guillermina Natera Rey.
Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México.



Impartido el lunes 19 de septiembre 2016
Escucha la grabación [aquí](#)

Implementación de un programa de detección e intervención breve utilizando un abordaje comunitario: Desafíos a superar.

Impartido por: Telmo Mota Ronzani.

Docente del Departamento de Psicología da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Brasil. Doutor em Ciências da Saúde e Coordenador do Centro de Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Drogas (CREPEIA).

Jueves 15 de diciembre 2016
11:00 am (hora de Washington)
Entra a la sesión webex [aquí](#)



Intervenciones breves sobre el consumo de alcohol en el embarazo: La experiencia de Argentina.

Impartido por: Aldana Lichtenberger.

Licenciada en Psicología. Especialista en Psicoterapia Individual y Grupal. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET). Grupo de Investigación en Sustancias Psicoactivas y Lesiones por Causa Externa, IPSIBAT- UNMdP- CONICET

Viernes 2 de junio 2017
12 a 13 pm (hora de Washington)



PROGRAMA

Prevalencia de consumo de alcohol prenatal y Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal en diferentes países

Svetlana Popova.
Investigadora Titular del Centre for Addiction and Mental Health, Centro colaborador OPS/OMS, Toronto, Canadá.
Profesora asociada de Dalla Lana School of Public Health, Epidemiology Division and Factor Inwentash Faculty of Social Work, University of Toronto.



La experiencia de la conferencia y taller en Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal, Santiago de Chile, Abril de 2017



Pablo Norambuena
Departamento de Salud Mental
Ministerio de Salud de Chile

Programa de intervención breve para adolescentes que abusan de las drogas- PIBA: retos en la implementación y la investigación.

Impartido por: Kalina Martínez Martínez.
Profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Profesora invitada de la Maestría de Psicología de las Adicciones, UNAM
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 2).
Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Jueves 31 de Mayo de 2018
12:00 pm (hora de Washington)




COLLABORATIVE PROJECTS

- SCALA: Scale-up of Prevention and Management of Alcohol Use Disorders and Comorbid Depression in Latin America.
Anderson P., O'Donnell A., Kaner E., Gual A., Schulte B., Pérez A., Natera G., Rehm. **COLOMBIA, PERU, MEXICO**
- e-Health Portal on Alcohol. WHO, BELARUSE, **BRAZIL, INDIA, MEXICO.**
- Multicentric study to reduce drug use-related stigma.
Ronzani et al. **ARGENTINA, BRAZIL, COLOMBIA, MEXICO, URUGUAY**
- LA Adaptation **of ORBITAL**, Shorter, Heather, Bray, Giles, Holloway et al., 2017. Delphi Study

GENERAL OBJECTIVE

Adaptation of the ORBITAL protocol
(Shorter et al., 2017) to develop a COS
to assess efficacy/effectiveness trials of
alcohol BI from the perspective of Latin
American experts.





Número de ocasiones de consumo alto / explosivo / de riesgo en un periodo de tiempo determinado.

(Una ocasión es un momento en el que se consume una o más copas).

Clasifique la importancia de este elemento en una escala de 1 a 9 donde:

1-3 significa "No importante": La variable no es importante para todos los estudios que evalúan intervenciones breves para el consumo de alcohol.

4-6 significa "Importante pero no crítico": La variable es importante, pero no todos los estudios sobre intervenciones breves para el consumo de alcohol necesitan medirla.


7-9 significa "Crítico": La variable debe medirse en todos los estudios sobre intervenciones breves para el consumo de alcohol.

*


1 2 3 4 5 6 7 8 9 No lo puedo calificar

Comentarios:

Country (n=332)




Main Profession (n=332)



Main activity

(n=332)



Next Steps

- Finalize Delphi study and draft report
- Continue to work with INEBRIA Latina members to strengthen the network
- Update directory
- List of publications (member zone)
- Improve communication and exchange
- Identify/create collaboration opportunities for efficacy/effectiveness and implementation research.